



MYOLAX[®]

4 mg

Thiocolchicoside

FORME ET PRESENTATION :

MYOLAX[®] 4 mg Comprimé; Boîte de 12 sous plaquettes thermoformées.

MYOLAX[®] 4 mg Comprimé; Boîte de 24 sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION :

MYOLAX[®] 4 mg Comprimé

Thiocolchicoside4 mg par comprimé.

Excipients : silice colloïdale anhydre, amidon de maïs pré-gélatinisé, cellulose microcristalline, lactose monohydraté, copovidone, stéarate de magnésium.

Excipients à effet notoire, dont la connaissance est nécessaire sans risque chez certains patients : lactose

CLASSE PHARMACO – THÉRAPEUTIQUE :

MYORELAXANT (M: Muscle et squelette).

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Myolax[®] 4 mg est utilisé dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses en rhumatologie.

ATTENTION !

DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT (CONTRE-INDICATIONS)

Myolax[®] 4 mg est contre-indiqué en cas :

- d'hypersensibilité au thiocolchicoside, à la colchicine ou à l'un des excipients,
- d'allaitement, de grossesse

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPÉCIALES ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Mises en garde spéciales :

Utiliser avec précaution en cas d'antécédents d'épilepsie ou de convulsions. La survenue de crise convulsive impose l'arrêt du traitement.

Précautions d'emploi :

En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, de nausées, de vomissements, prévenez votre médecin.

L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose ou au fructose, un déficit en lactase de Lapp, un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose ou un déficit en sucrase/ isomaltase (maladies héréditaires rares).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE-ALLAITEMENT :

Grossesse

L'utilisation de ce médicament est contre-indiqué pendant toute la durée de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin.

Allaitement :

ce médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les possibilités de somnolence attachées à l'usage de ce médicament même si elles restent très rares.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE (plus de 15 ans).

la dose quotidienne est de 4 comprimés par jour, en 2 prises

Dans tous les cas, se conformer strictement de l'ordonnance de votre médecin.

Mode d'administration

Avaler les comprimés avec un verre d'eau au cours des repas.

Durée de traitement

Conformez vous strictement à la prescription de votre médecin

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

INSTRUCTIONS EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de prise d'une dose excessive, appelez immédiatement votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES)

Comme tous les médicaments, Myolax® 4 mg Comprimé est susceptible, d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Très rares réactions allergiques type urticaire, oedème de la face et exceptionnellement choc anaphylactique.
- Très rares réactions allergiques cutanées, telles que démangeaisons, érythème, éruptions et exceptionnellement éruptions avec vésicules ou bulles.
- Rares troubles digestifs : diarrhées, douleurs d'estomac, nausées et vomissements.
- Très rares cas de somnolence, exceptionnel cas de convulsion ou de récédive de crise chez les patients épileptiques.

SIGNELEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Médicament à maintenir hors de portée des enfants.

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE :

Aout 2014

TABLEAU A (LISTE I)

Myolax® 4 mg Comprimé boîte de 12 A.M.M N° : 904.392.1

Myolax® 4 mg Comprimé boîte de 24 A.M.M N° : 904.392.2

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT / INFORMATION MÉDICALE

Laboratoires ADWYA

Route de la Marsa km 14 - BP 658 - 2070 La Marsa Tunisie.Tél. : +216 71 854 888 (LG) - Fax: +216 71 854 900 - e-mail : adwya@adwya.com.tn

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر و لكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالتبيب و الصيدلاني هما الجبراني بالدواء و نفعه و ضرره.
- لا تطلق يدك العلاج المجددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد ولا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

C0938/02

CL 183

