


  
**Viatec®**

Sildénafil / Sildenafil

  
100mg  
50mg  
25mg**FORMES ET PRESENTATIONS :****VIATEC®** 25 mg: comprimé pelliculé (elliptique, bleu); Boîte de 4 et Boîte de 8, sous plaquettes thermoformées.**VIATEC®** 50 mg: comprimé pelliculé (elliptique, bleu); Boîte de 4 et Boîte de 8, sous plaquettes thermoformées.**VIATEC®** 100 mg: comprimé pelliculé (elliptique, bleu); Boîte de 4 et Boîte de 8, sous plaquettes thermoformées.**COMPOSITION :**

Sildénafil .....25 mg pour un comprimé pelliculé.

Sildénafil .....50 mg pour un comprimé pelliculé.

Sildénafil .....100 mg pour un comprimé pelliculé.

Sous forme de citrate

**Excipients:** Hydrogénophosphate de calcium anhydre, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique stéarate de magnésium, macrogol 6000, Sépifilm bleu.**CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE****VIATEC®** appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiésterase de type 5 (PDE5).**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT****INDICATIONS THERAPEUTIQUES**

L'action du VIATEC® consiste à aider la relaxation des vaisseaux sanguins du pénis, favorisant l'afflux sanguin dans le pénis lors d'une excitation sexuelle. VIATEC® vous aidera à obtenir une érection uniquement si vous avez une stimulation sexuelle.

VIATEC® est un traitement pour les hommes souffrant de troubles de l'érection, parfois appelés impuissance; c'est à dire quand un homme ne peut pas atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle.

**ATTENTION****DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT****CONTRE-INDICATIONS**

Ne prenez jamais VIATEC®, comprimé pelliculé dans les cas suivants:

- Si vous n'avez pas de troubles de l'érection.
- Si vous êtes une femme.
- Si vous prenez des médicaments contenant des dérivés nitrés ou des donneurs d'oxyde nitrique comme le nitrite d'amyle (« poppers »). Ces médicaments sont souvent utilisés pour le soulagement des crises d'angine de poitrine (ou angor), cette association peut entraîner une diminution potentiellement dangereuse de votre pression artérielle. Prévenez votre médecin si vous prenez l'un de ces médicaments.
- Si vous êtes allergique (hypersensible) au sildénafil ou à l'un des autres composants contenus dans VIATEC®.
- Si vous avez de graves problèmes cardiaques ou du foie.
- Si vous avez eu récemment un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque ou si votre pression sanguine est basse.
- Si vous souffrez de certaines maladies rares héréditaires des yeux (comme la rétinite pigmentaire).
- Si vous avez déjà présenté une perte de vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artérielle (NOIAN).

**EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.****PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ; MISES EN GARDE SPÉCIALES**

Faites attention avec VIATEC®, comprimé pelliculé:

Informez votre médecin.

- Si vous avez une drépanocytose (anomalie des globules rouges), une leucémie (cancer des cellules sanguines), ou un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse).

- Si vous présentez une maladie ou déformation du pénis.
- Si vous avez des problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement si votre cœur peut tolérer le surcroît d'effort entraîné par l'activité sexuelle.
- Si vous souffrez actuellement d'un ulcère à l'estomac ou de troubles de la coagulation (tels que l'hémophilie).
- Si vous ressentez une diminution ou une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre VIATEC® et contactez immédiatement votre médecin.

Vous ne devez pas utiliser VIATEC® en même temps que tout autre traitement des troubles de l'érection.

**Précautions particulières pour les enfants**

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

**Considérations particulières pour les patients ayant des problèmes rénaux ou hépatiques**  
Vous devez informer votre médecin si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut alors décider de vous prescrire une dose plus faible.**INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES**

SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RÉCEMMENT UN AUTRE MÉDICAMENT, Y COMPRIS UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE, PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

Les comprimés de VIATEC® peuvent interagir avec d'autres médicaments, particulièrement ceux utilisés pour l'angine de poitrine. Dans l'éventualité d'une urgence médicale, vous devez informer la personne qui vous soigne que vous avez pris VIATEC®. Ne prenez pas VIATEC® en même temps que d'autres médicaments sauf si votre médecin vous l'indique.

VIATEC® peut entraîner une augmentation importante des effets des médicaments appelés dérivés nitrés et donneurs d'oxyde nitrique comme le nitrite d'amyle (« poppers »). Ils sont souvent utilisés en cas d'angine de poitrine (ou « douleurs thoraciques »).

Vous NE devez PAS prendre VIATEC® si vous prenez ces médicaments.

Si vous prenez des anti-protéases, notamment pour le traitement d'une infection par le VIH, votre médecin pourrait être amené à débuter votre traitement par VIATEC® avec la dose la plus faible (25 mg).

Certains patients prenant un médicament alpha-bloquant pour le traitement d'une pression artérielle élevée ou de problèmes de prostate peuvent ressentir des vertiges ou des sensations d'ébriété lorsqu'ils se lèvent; ce sont les symptômes d'une hypotension orthostatique, c'est à dire d'une pression artérielle basse lors du passage rapide à la position assise ou à la position debout. Certains patients ont éprouvés ces symptômes lorsqu'ils prenaient du VIATEC® avec des alpha-bloquants.

Ceci survient le plus souvent dans les 4 heures suivant la prise de VIATEC®.

Afin de réduire la probabilité de survenue de ces symptômes vous devez être traité par une dose quotidienne constante d'alpha-bloquant avant de débuter un traitement par VIATEC®. Votre médecin peut initier votre traitement par VIATEC® à une dose de 25 mg.

**GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

VIATEC® n'est pas indiqué chez la femme.

**CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES.**

VIATEC® peut entraîner des étourdissements et peut affecter la vision. Avant de conduire un véhicule ou d'utiliser une machine, vous devez savoir comment vous réagissez sous VIATEC®.

**COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT****Posologie**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin.

En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien. La dose habituelle est de 50 mg Si vous avez déjà présenté une perte de vision ou trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

VIATEC® vous aidera à avoir une érection uniquement si vous avez une stimulation sexuelle. Le délai d'action de VIATEC® varie d'une personne à l'autre, il est normalement d'une demi-heure à une heure. Vous pouvez observer que VIATEC® agit plus lentement si vous le prenez lors d'un repas riche en graisses.

Si VIATEC® ne vous permet pas d'avoir une érection ou si votre érection n'est pas assez longue, pour vous permettre d'avoir un rapport sexuel complet, parlez-en à votre médecin.



## Mode et voie d'administration

### voie orale

Vous ne devez pas prendre VIATEC® plus d'une fois par jour.

Vous devez prendre VIATEC® environ une heure avant une relation sexuelle.

Avez-le comprimé en entier, sans le mâcher, avec un peu d'eau.

### Fréquence d'administration

VIATEC® peut être pris au cours ou en retard des repas. Quand VIATEC® est pris avec de la nourriture, son action est quelque peu réduite.

l'ingestion d'alcool peut altérer de façon transitoire votre capacité d'obtenir une érection; pour obtenir le maximum de bénéfice de votre traitement, il vous est conseillé de ne pas boire beaucoup d'alcool avant de prendre VIATEC®.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

### Intructions en cas de surdosages

Une dose supérieure à 100 mg n'augmentera pas l'efficacité du produit. Cependant cela provoquera une augmentation des effets indésirables et de leur sévérité.

Ne prenez pas plus de comprimés que vous ne devez.

EN CAS DE SURDOSAGE CONSULTEZ VOTRE MEDECIN TRAITANT

### Instruction en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MEDICAMENT, DEMANDEZ VOUS D'INFORMATIONS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

## EFFETS INDESIRABLES

Comme tous les médicaments, VIATEC® comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ces effets sont généralement légers à modérés.

Si vous ressentez des douleurs thoraciques pendant ou après un rapport sexuel:

- Installez-vous en position semi-assise et essayez de vous détendre
- Ne prenez pas de dérivés nitrés pour traiter votre douleur thoracique
- Contactez immédiatement votre médecin

Tous les médicaments, y compris VIATEC®, peuvent provoquer des réactions allergiques. Vous devez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants après avoir pris VIATEC® :

- Respiration sifflante brutale
- Difficultés respiratoires ou vertiges
- Gonflement des paupières, de la face, des lèvres ou de la gorge.

Des érections prolongées et parfois douloureuses ont été décrites après la prise de VIATEC® Si votre érection persiste plus de quatre heures, contactez immédiatement votre médecin.

Si vous présentez une diminution ou une perte brutale de la vue, arrêtez de prendre VIATEC® et contactez immédiatement votre médecin.

### Effets indésirables très fréquents:

- céphalées

### Effets indésirables fréquents:

- rougeurs de la face, digestion difficile, troubles visuels (trouble de la perception des couleurs, perception accrue de la lumière ou vision trouble), nez bouché et sensations vertigineuses.

### Effets indésirables peu fréquents:

- vomissements, éruption cutanée, hémorragie postérieure de l'œil, yeux injectés de sang / yeux rouges, douleur oculaire, diplopie, sensibilité anormale des yeux, battements de cœur irréguliers ou rapides, douleurs musculaires, somnolence, sens tactile diminué, vertige, acouphènes, nausées bouche sèche, douleur thoracique et sensation de fatigue.

### Effets indésirables rares:

- hypotension, hypotension, évanouissement, accident vasculaire cérébral, saignement de nez et diminution ou perte brutale de l'audition.

Les autres effets indésirables rapportés dans les études de pharmacovigilance sont les suivants: palpitations, douleur thoracique, mort subite, crise cardiaque ou diminution temporaire de l'apport de sang à certaines parties du cerveau. La plupart de ces hommes, mais pas tous, avaient des problèmes cardiaques avant de prendre ce médicament. Il n'est pas possible de déterminer si ces événements étaient directement liés au sildénafil. Des cas de convulsions ou d'épilepsie et de réactions cutanées graves caractérisées par une éruption, des bulles, une desquamation cutanée et des douleurs, exigeant des soins médicaux immédiats, ont également été rapportés.

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENNENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

### CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE : Janvier 2012

VIATEC® 25 mg comprimé pelliculé (boîtes de 4) : A.M.M n°: 904.408.1

VIATEC® 25 mg comprimé pelliculé (boîtes de 8) : A.M.M n°: 904.408.2

VIATEC® 50 mg comprimé pelliculé (boîtes de 4) : A.M.M n°: 904.408.3

VIATEC® 50 mg comprimé pelliculé (boîtes de 8) : A.M.M n°: 904.408.4

VIATEC® 100 mg comprimé pelliculé (boîtes de 4) : A.M.M n°: 904.408.5

VIATEC® 100 mg comprimé pelliculé (boîtes de 8) : A.M.M n°: 904.408.6

Tableau A - Liste 1

### NOM ET ADRESSE DU FABRICANT / INFORMATIONS MEDICALES :

Laboratoires ADWYA Route de La Marsa Km 14 - B.P.658 – 2070 LA MARSA TUNISIE

Tél : +216 71 854 888 - Fax : +216 71 854 900. e-mail : adwya@adwya.com.tn

#### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Sachez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

#### ان هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال الموصى عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما اخصائي الدواء ونصحه و ضرره.
- لا تعط مدة العلاج اقل من تلك الموصى بها.
- لا تعاد ولا تزر عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

CO805/02  
CL263

