

Novasfon[®] 80 mg 160 mg

Phloroglucinol dihydraté



FORME ET PRESENTATION :

Novasfon[®] 80 mg, comprimé orodispersible boîte de 20, sous plaquettes thermoformées.

Novasfon[®] 160 mg, comprimé orodispersible boîte de 12, sous plaquettes thermoformées.

COMPOSITION :

Novasfon[®] 80 mg

Phloroglucinol dihydraté 80 mg

Pour un comprimé orodispersible.

Novasfon[®] 160 mg

Phloroglucinol dihydraté 160 mg

Pour un comprimé orodispersible.

Excipients : Lactose monohydraté, cellulose microcristalline, crospovidone, povidone K90, stéarate de magnésium, aspartam (E951).

Excipients à effet notoire : Lactose, aspartam.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Ce médicament est un antispasmodique musculotrope

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

- Traitement symptomatique des douleurs liées aux troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
- Traitement des manifestations spasmodiques et douloureuses aiguës des voies urinaires : coliques néphrétiques.
- Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques douloureuses en gynécologie.
- Traitement adjuvant des contractions au cours de la grossesse en association au repos.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Novasfon[®], comprimé orodispersible dans les cas suivants:

- allergie connue au phloroglucinol ou à l'un des autres composants du produit.
- en cas de phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance), en raison de la présence d'aspartam.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI; MISES EN GARDE SPECIALES

Faites attention avec Novasfon[®], comprimé orodispersible :

Si vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament, en raison de la présence de lactose.

Ce médicament contient une source de phénylalanine, il peut être dangereux pour les patients atteints de phénylcétonurie.

L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire.

L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT

Posologie, Mode et/ou voie d'administration, Fréquence d'administration et durée du traitement

Voie orale

Chez l'adulte :

la posologie est de 2 comprimés de Novasfon® 80 mg ou de 1 comprimé de Novasfon® 160 mg, à prendre au moment de la crise, à renouveler en cas de spasmes importants en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 3 comprimés de Novasfon® 160 mg ou 6 comprimés de Novasfon® 80 mg par jour. Les comprimés sont à laisser fondre sous la langue pour un effet rapide ou à dissoudre dans un verre d'eau avant ingestion.

Chez l'enfant :

1 comprimé de Novasfon® 80 mg 2 fois par jour, après dissolution dans un verre d'eau.

Si vous avez l'impression que l'effet de Novasfon® comprimés dispersibles est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES) :

Comme tous les médicaments, Novasfon® comprimé orodispersible est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

Quelques très rares cas de réactions allergiques de la peau.

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNÉS DANS CETTE NOTICE, OU SI CERTAINS EFFETS INDESIRABLES DEVIENNENT GRAVES, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas 25°C.

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

Février 2016

Novasfon® 80 mg comprimé orodispersible Boite de 20 : A.M.M N°: 904.419.1

Novasfon® 160 mg comprimé orodispersible Boite de 12 : A.M.M N°: 904.419.2

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Les laboratoires ADWYA

Route de la Marsa Km 14 - B.P 658 - 2070 La Marsa - Tunisie

Tél. : (+216) 71 854 888/ Fax : (+216) 71 854 900 - E-mail : adwya@adwya.com.tn

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit, comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS À LA PORTEE
DES ENFANTS

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر و لكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- أتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المخصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب و الصيدلاني هما الخبيران بالدواء و نفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد و لا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

C1807/02
Cl. 192

