



Gabentin®

Gabapentine

600 mg

FORME ET PRESENTATION :

Gabentin® 600 mg comprimé pelliculé, Boîte de 50, sous plaquettes thermoformés.

COMPOSITION :

Gabentin® 600 mg comprimé pelliculé.

Gabapentine.....600 mg par comprimé

Excipients : lactose monohydrate, amidon de maïs, talc, stéarate de magnésium.

Excipient à effet notoire : lactose.

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

Autres anti-épileptiques (Code ATC : N03AX12)

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT

INDICATIONS THERAPEUTIQUE

Ce médicament est un antiépileptique réservé au traitement de certains types d'épilepsies de l'adulte et de l'enfant de plus de 12 ans, seul ou en association aux autres antiépileptiques.

Il peut être aussi utilisé chez l'enfant à partir de 3 ans en association aux autres antiépileptiques.

Il est également utilisé chez l'adulte, dans le traitement des douleurs qui suivent la cicatrisation d'un zona.

ATTENTION

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT CONTRE-INDICATIONS :

Ne pas prendre Gabentin® 300 mg gélule en cas d'allergie connue à la gabapentine ou à l'un des composants (voir composition).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS

D'EMPLOI :

Ce médicament n'est pas efficace dans certaines formes d'épilepsie.

En cas d'augmentation de la fréquence des crises ou d'apparition de crises de type différent, CONSULTER IMMEDIATEMENT VOTRE MEDECIN

Respectez les doses prescrites et n'arrêtez pas votre traitement sans l'avis de votre médecin.

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être administré en cas de galactosémie congénitale, de syndrome, de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

En tant qu'antiépileptique, ce médicament ne doit pas être utilisé seul chez l'enfant de moins de 12 ans.

Dans le traitement de la douleur post-zona, il est réservé à l'adulte.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Veillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Avvertir votre médecin en cas de désir de grossesse.

Votre traitement antiépileptique ne doit pas être interrompu. Votre médecin peut néanmoins décider d'arrêter les autres traitements

antiépileptiques pendant le premier trimestre de votre grossesse.

Une surveillance échographique pourra être éventuellement envisagée.

L'allaitement est déconseillé en cas d'utilisation de ce médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament peut être à l'origine de somnolence, sensations de vertige, difficulté à coordonner des mouvements, mouvements involontaires des globes oculaires et peut donc réduire votre vigilance. Il est donc déconseillé de conduire des véhicules ou d'utiliser des machines.

Dans l'épilepsie :


Si votre maladie n'est pas contrôlée, c'est-à-dire si vous continuez à avoir des crises, il est dangereux de conduire ou d'utiliser des machines potentiellement dangereuses.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie :

La posologie sera déterminée par votre médecin et adaptée progressivement. Elle est strictement individuelle. Dans tous les cas, se conformer strictement à la prescription de votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'effet de Gabentin® 300 mg gélule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.



Mode et voie d'administration :

Voie orale

La gélule est à avaler sans la croquer, avec un peu d'eau, par exemple au moment du repas.

Dans les cas où le patient présente des difficultés pour avaler la gélule ou chez l'enfant de moins de 6 ans, celle-ci peut être ouverte et son contenu mélangé à un aliment.

Fréquence d'administration :

La dose journalière sera répartie en 2 ou 3 prises, par exemple au moment des repas.

Durée de traitement :

Vous devez impérativement respecter la posologie et la durée du traitement prescrites, en particulier vous ne devez pas interrompre le traitement sans demander l'avis de votre médecin.

En cas de surdosage :

Si vous avez pris plus de Gabentin® 300 mg gélule que vous n'auriez dû, avertir un médecin en urgence.

En cas d'omission d'une ou de plusieurs doses :

Si vous oubliez de prendre Gabentin® 300 mg gélule, prenez-le dès que vous vous en apercevez, mais si vous vous en apercevez au moment de la prise de votre prochaine dose, ne doublez pas la dose. Ensuite, continuez comme précédemment.

Sevrage :

L'arrêt du traitement par par Gabentin® 300 mg gélule doit se faire de manière progressive, en effet l'arrêt brutal du traitement (ou la diminution importante des doses) peut entraîner la réapparition des crises chez les sujets épileptiques.

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS :

Comme tous les médicaments Gabentin® 300 mg gélule, est susceptible d'avoir des effets indésirables.

Dans l'ordre de fréquence :

- Augmentation du nombre de crises d'épilepsie, somnolence, difficulté à coordonner les mouvements, sensations de vertige, nervosité, insomnie, mouvements involontaires des globes oculaires, troubles de la sensibilité cutanée (par exemple fourmillements des extrémités), troubles du comportement (agitation, irritabilité, agressivité).

- Fatigue, maux de tête, prise de poids.
- Nausées, vomissements, perte d'appétit.
- Anomalies de la fonction du foie.
- Réactions allergiques de la peau.

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION

NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTÉRIEUR.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C
En cas de signes visibles de détérioration, prévenir votre pharmacien.

MEDICAMENT A MAINTENIR HORS DE PORTEE DES ENFANTS

DATE D'APPROBATION DE LA NOTICE

Février 2013

NOM ET ADRESSE DU FABRICANT

Les laboratoires ADWYA

Route de la Marsa Km 14 - B.P 658 - 2070 La Marsa - Tunisie

Tél. : (+216) 71 854 888/ Fax : (+216) 71 854 900

E-mail : adwya@adwya.com.tn

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament n'est pas un produit comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et ses contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin

NE LAISSEZ JAMAIS LES MÉDICAMENTS A LA PORTEE
DES ENFANTS

ان هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الاستعمال المنصوص عليها و تعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- فالطبيب والصيدلاني هما الخبيران بالدواء ونفعه و ضرره.
- لا تقطع مدة العلاج المحددة لك من تلقاء نفسك.
- لا تعد و لا تزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

