

24<sup>DT</sup>,350

+240 millimes



Voie orale



NovaClav®  
Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1  
1g/125mg  
Poudre pour solution buvable  
Voie orale

NovaClav®  
Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1  
1g/125mg  
Poudre pour suspension buvable en sachet  
Voie orale



18<sup>DT</sup>,136

+240 millimes



12<sup>DT</sup>,110  
+240 millimes



8<sup>DT</sup>,788

+240 millimes

12  
sachets

12  
كيسا

**NovaClav**<sup>®</sup>

Amoxicilline-Acide Clavulanique

**500mg/62,5mg**

نوفاكلاف  
Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1  
500mg/62,5mg

Poudre pour solution buvable

Voie orale



**NovaClav**<sup>®</sup>  
Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1  
**500mg/62,5mg**


Poudre pour solution buvable  
Voie orale

**NovaClav**<sup>®</sup>  
Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1  
**500mg/62,5mg**

Poudre pour suspension buvable en sachet  
Voie orale



**11<sup>DT</sup>,540**  
+240 millimes



15<sup>DT</sup>,997

+240 millimes

24

comprimés  
pelliculés

NovaClav<sup>®</sup>

Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1

500mg/62,5mg

Voie orale



NovaClav<sup>®</sup>  
Amoxicilline-Acide Clavulanique 1/8/1  
500mg/62,5mg

24  
comprimés  
pelliculés



**8<sup>DT</sup>,600**  
+240 millimes

# NovaClav<sup>®</sup>

Amoxicilline-Acide Clavulanique : 8/1

**100mg/12,5mg par ml**

**Poudre pour  
suspension buvable**

- 10,27 g de poudre correspondent à 60 ml de suspension buvable reconstituée,
- soit 224 doses-graduation (1 dose = 1 kg)

Voie orale

